

KRANKENKASSEN-
ZULÄSSIG!

WE CARE
ABOUT
YOU

«Geniessen Sie
Frühlingsgefühle.»

Cetirizin-Teva® – das Antihistamin-Generikum.



Gekürzte Fachinformation Cetirizin-Teva®:

Z Filmtabletten (teilbar): Cetirizin 10 mg ut Cetirizini dihydrochloridum, Acidum sorbicum (E200); Excipients pro compresso obducto. Tropfen: Cetirizin 10 mg ut Cetirizini dihydrochloridum, Methylis parahydroxybenzoas (E218), Propylis parahydroxybenzoas (E216), Saccharinum; Excipients ad solutionem pro 1 ml.
I Erwachsene und Kinder ab 6 J.: Allergische Rhinitis, allergische Konjunktivitis, chronische idiopathische Urtikaria
Kinder 2–6 J.: Allergische Rhinitis
KI Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff, einem anderen Piperazin-Derivat oder einem der Hilfsstoffe. Terminale Niereninsuffizienz.
D ≥ 6 J.: 1x tgl. 10 mg (1 Filmtablette oder 20 Tropfen) abends (6–12 J. während max. 4 Wo); 2–6 J.: 5 mg tgl. (je 5 Tropfen morgens und abends) während max. 4 Wo.
P Cetirizin-Teva® Tabletten à 10mg 10* (C), 30*, 50* (B). Tropfen 10 mg/ml 20 ml* (B).
ATC R06AE07

Teva Pharma AG, Industriestr. 111, 4147 Aesch
www.tevapharma.ch

